

Số: 23/TB - UBND

Vũ Tiên, ngày 04 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân

Hiện nay, theo điều tra của trạm kỹ thuật nông nghiệp Vũ Thư toàn bộ diện tích lúa Xuân của xã nhà đang trong giai đoạn tập trung trổ bông, tình hình sâu bệnh diễn ra hết sức phức tạp:

- Sâu non cuốn lá nhỏ sẽ nở rộ từ ngày 4-10/5/2026, mật độ 20-40c/m²; cá biệt 100-120c/m², sâu non sẽ gây hại trên các diện tích lúa trổ bông sau ngày 5/5/2026
- Rầy lúa 2 đã và đang nở rộ, mật độ 100-200c/m², nơi cao 300-500c/m².

Ngoài ra, do điều kiện thời tiết thuận lợi bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn... đã và đang phát sinh gây hại.

Để đảm bảo an toàn sâu bệnh, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các Phòng chuyên môn, các HTX NN, các cơ sở thôn trong toàn xã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật như sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:

- Tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh (BC15, TBR225, Bắc thơm, T10, Đài thơm...) khi điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, có gió mùa, đêm và sáng có sương. Phun trừ lần 1 khi lúa trổ 3% - 5%, lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn

-Thuốc dùng: Filia 525SE; Beam 75WP; Kasoto 200SC; Katana 20SC,...

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm:

- Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 6-8/5/2026, trên diện các diện tích lúa trổ bông sau ngày 5/5/2026.

Thuốc dùng: Incipio 200SC, Ammate 150EC, Bite 30SC, August 350WG, Clever 150SC (300WG),...

- Phun trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 12-14/5, trên các diện tích lúa trổ bông sau ngày 10/5/2026

Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Incipio 200SC, Chloferan 240SC (Vua đục thân, Bảo kiếm), Prevathon 200SC, Voliam targo 063SC...

3. Đối với rầy:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện rầy có khoảng 30con/khóm trở lên phải phun trừ bằng một trong các loại thuốc: Chess 50WG; Sutin 50SC, Oshin 20WP, Led 70WG;...

4. Đối với bệnh khô vằn

Thời tiết nắng nóng, bệnh phát sinh gây hại mạnh; cần lưu ý tới các ruộng gieo cấy dày, khi tỷ lệ bệnh 10% trở lên cần phun trừ bằng một trong các loại thuốc: Tiltsuper 300EC, Anvil 5SC; Amistartop 325SC, Nevo 330EC, ...

5. Lúa cỏ (lúa ma):

Lúa trổ bông là thời điểm tốt nhất để cắt bỏ và tiêu hủy lúa cỏ; tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy trước khi thu hoạch lúa đại trà khoảng 15-20 ngày, không để hạt lúa cỏ chín rụng xuống sẽ là nguồn lây lan cho vụ sau.

Lưu ý:

- Các HTXNN cần chuẩn bị đầy đủ lượng thuốc phun; theo sát các thông báo, hướng dẫn của trạm Kỹ thuật Nông nghiệp và UBND xã; tránh việc thông báo không đúng trọng tâm, nhân dân phun trừ thuốc tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi trường.

- Nồng độ và lượng nước phun theo khuyến cáo trên bao bì; phun vào lúc trời tạnh, lá khô ráo, tránh thời điểm lúa phơi màu; sau phun 4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay khi trời tạnh. Vỏ thuốc sau khi sử dụng phải được thu gom bỏ đúng nơi quy định.

Nhận được thông báo này, đề nghị phòng kinh tế, các Hợp tác xã Nông nghiệp, lãnh đạo các cơ sở thôn căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương tuyên truyền để nông dân thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Các HTX NN;
- Các đ/c trưởng thôn;
- Lưu: VP, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Quang

